



Lea esta información importante antes de tomar:

Hidrocodona con Acetaminofén

Presentado a usted por el Institute for Safe Medication Practices



[Se necesita mucho más cuidado, porque hidrocodona con acetaminofén es una **medicina de alerta máxima**.]

Se ha demostrado que los **medicamentos de alerta máxima** son seguros y eficaces. Sin embargo, estos medicamentos pueden causar lesiones graves si ocurre un error al tomarlos. Esto significa que es muy importante que sepa acerca de este medicamento y lo tome según lo indicado.

Lista de los 10 principales Consejos de Seguridad para hidrocodona con acetaminofén

Al surtir su receta



- ❑ 1 **Revise su medicina.** Si su médico le receta este medicamento usando uno de sus nombres de marca, podría confundirse con otros medicamentos que tienen nombres similares. Por ejemplo, una receta escrita a mano para Lorcet puede ser confundida como Fioricet. Lortab podría ser confundido como Luride. Vicodin podría ser confundido como Hycodan. Cuando recoja su receta en la farmacia, asegúrese de tener el medicamento correcto.

Al tomar su medicamento



- ❑ 2 **No tome con otros medicamentos de acetaminofén.** Este analgésico tiene dos ingredientes activos: hidrocodona y acetaminofén (también conocido como **Tylenol**, y a menudo abreviado como **APAP**). El exceso de acetaminofén puede dañar el hígado y causar la muerte. Al estar tomando hidrocodona con acetaminofén, no tome acetaminofén sin receta o medicamentos que contengan acetaminofén, incluyendo **medicamentos para el resfriado**. Los adultos no deben tomar más de 3,000 a 4,000 mg de acetaminofén por día. Dependiendo de lo que su médico le recetó, cada dosis de tableta o líquido de este medicamento contiene entre 300 mg y 750 mg de acetaminofén.



- ❑ 3 **Reporte todos los medicamentos.** Informe a su médico y farmacéutico sobre todos los medicamentos con y sin prescripción que está tomando, para poder identificar otros medicamentos que contienen acetaminofén.



- ❑ 4 **Lea las etiquetas de los medicamentos.** Siempre lea los ingredientes activos en las etiquetas del medicamento (bajo Información del Medicamento en las etiquetas de los medicamentos de venta sin receta) para evitar tomar otros medicamentos que contienen acetaminofén.



- ❑ 5 **Tome precauciones.** Es posible que se sienta somnoliento mientras está tomando este medicamento. Evite tareas que requieren alerta mental, tales como conducir o manejar maquinaria. Evite beber alcohol mientras esté tomando este medicamento.



- ❑ 6 **Prevenga y trate el estreñimiento.** El estreñimiento es un efecto secundario común al tomar este medicamento durante varios días. Hacer ejercicio, comer fibra y tomar agua puede ayudar, pero es posible que deba pedir a su médico o farmacéutico que le recomiende un laxante. Si su estreñimiento parece ser grave o no responde a los laxantes, llame a su médico. Esto puede ser un síntoma de un bloqueo en sus intestinos, un efecto secundario poco frecuente pero grave.

Cuando se deshaga de medicamento sin usar



- ❑ 7 **Deseche los medicamentos de forma segura.** Deseche el medicamento sin usar o expirado en un recipiente sellado (lata de café con tapa, por ejemplo) después de mezclarlo con una sustancia indeseable, tal como arena para gatos o granos de café. Esto ayuda a evitar que los niños y las mascotas entren en contacto con el medicamento en la basura.

Cuándo debe llamar a su médico



- ❑ 8 **Dolor continuo.** Llame a su médico si el dolor empeora al tomar el medicamento, o si el medicamento no ayuda a controlar el dolor. No tome dosis adicionales. **Tomar demasiado medicamento puede ser fatal**, ya que puede disminuir o detener su respiración.



- ❑ 9 **Síntomas de sobredosis.** Llame a su médico si experimenta fatiga extrema, dificultad para despertarse y/o respiración superficial o muy lenta.

- ❑ 10 **Síntomas de abstinencia.** El uso prolongado de hidrocodona puede llevar a la dependencia. La suspensión repentina del medicamento después de su uso prolongado puede conducir a síntomas de abstinencia (por ejemplo, pupilas dilatadas, secreción nasal, sudoración, enrojecimiento de la cara, síntomas gripales, respiración rápida). Busque asistencia médica si se presentan estos síntomas.

Llame

Hidrocodona con Acetaminofén

▼ ¡Lea estos Datos rápidos sobre su medicina!



Temas	Datos rápidos
Nombre genérico	■ hidrocodona y acetaminofén (genérico disponible)
Nombres de marcas comunes	■ Vicodin, Vicodin ES, Vicodin HP, Lorcet 10/650, Lorcet Plus, Lortab, Maxidone, Norco, Zydone, Co-Gesic, Hycet, Margesic H, Stagesic, Xodol, Zamicet
Usos	■ Se usa para tratar el dolor de moderado a severo
Límites habituales de dosis	■ Dolor moderado: 2½ (2.5) a 5 mg de hidrocodona cada 4 a 6 horas ■ Dolor severo: 10 mg de hidrocodona cada 4 a 6 horas ■ No exceda de 3,000 a 4,000 mg por día de acetaminofén (dependiendo de lo que su médico le recetó, cada dosis de tableta o líquido contiene entre 300 mg y 750 mg de acetaminofén)
Instrucciones y precauciones especiales	■ Tome exactamente según lo prescrito ■ Llame a su médico si el dolor no se alivia; no tome dosis adicionales. ■ No tome acetaminofén regular (Tylenol) mientras está tomando este medicamento ■ Al tomar este medicamento, no tome medicamentos sin receta para la tos y el resfriado u otros medicamentos que contengan acetaminofén ■ No conduzca ni maneje maquinaria mientras esté tomando este medicamento, ya que puede causar sueño y perjudicar su coordinación; tenga cuidado al subir escaleras ■ Evite beber alcohol mientras esté tomando este medicamento. ■ No inicie ni deje de tomar ningún medicamento, incluyendo medicamentos sin receta, hierbas y vitaminas, sin consultar con su médico o farmacéutico
Posible dependencia al medicamento con el uso prolongado	■ La hidrocodona es un opioide que causa un sentido exagerado de bienestar, lo que puede conducir a una dependencia física y psicológica con el uso prolongado ■ Suspender repentinamente el medicamento después de un uso prolongado puede conducir a síntomas de abstinencia (vea el consejo de seguridad #10 en la parte posterior de la página) ■ La dependencia grave raramente ocurre cuando se toma el medicamento según lo prescrito para el alivio a corto plazo del dolor
Seguridad durante el embarazo/lactancia	■ Informe a su médico si está embarazada o queda embarazada ■ El uso de este medicamento durante el embarazo puede producir dependencia física en un bebé ■ Evite tomar este medicamento durante periodos prolongados o en dosis altas cerca de la fecha del parto ■ La hidrocodona entra en la leche materna, por lo que no se recomienda durante la lactancia ■ Si se toma durante la lactancia, dígaselo al pediatra de su bebé, tome la dosis inmediatamente después de amamantar o 3 a 4 horas antes del siguiente amamantamiento, e informe de inmediato los cambios que presente su bebé, como un aumento de la somnolencia (más allá de lo habitual), dificultad para respirar, cambios en el patrón de alimentación del bebé o apatía
Informe a su médico si usted tiene:	■ Enfermedades: enfermedad hepática, enfermedad pulmonar, problemas respiratorios, enfermedades del corazón, una lesión en la cabeza, antecedentes de convulsiones, trastornos de la tiroides, enfermedad de Addison ■ Alergias a: acetaminofén, codeína, otros analgésicos potentes ■ Está tomando drogas ilícitas o bebe 3 o más bebidas alcohólicas al día
Almacenamiento y eliminación	■ Guarde a temperatura ambiente, protegido de la luz y la humedad ■ Deseche las tabletas de forma segura en la basura; no las arroje por el inodoro ■ Mantenga en un lugar seguro lejos del alcance de los niños (y adolescentes, ya que son comunes los abusos con este fármaco)
Efectos secundarios que debe informar a su médico inmediatamente	■ Dificultad para respirar, respiración muy lenta, latido cardíaco lento, mareos o dolor de cabeza persistente, somnolencia excesiva, confusión, debilidad, temblores, visión borrosa, vómitos, espasmos musculares, dificultad para orinar, pérdida de la audición, reacción alérgica
Otras condiciones para informar a su médico	■ Estreñimiento, náuseas, picazón, erupciones en la piel
Medicamentos sin receta médica/a base de hierbas que no deben tomarse con hidrocodona y acetaminofén	■ Acetaminofén (incluyendo Tylenol) ■ Medicamentos para la tos y el resfriado que contengan acetaminofén ■ A base de hierbas como la valeriana, hierba de San Juan, SAME, kava kava
Medicamentos con receta médica que no deben tomarse con hidrocodona y acetaminofén	■ Otros medicamentos con receta que contienen acetaminofén ■ Sedantes, tranquilizantes, antihistamínicos, otros analgésicos fuertes ■ Alvimopan (Entereg), imatinib (Gleevec)

Esta información no reemplaza la necesidad de seguir las instrucciones del médico y leer el folleto con información del medicamento provista con su receta.

Este proyecto fue apoyado por la subvención número R18HS017910 de la Agency for Healthcare Research and Quality. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa la opinión oficial de la Agency for Healthcare Research and Quality.